

乳腺	レジメン名	使用薬剤	投与量	投与日	終了日	催吐リスク
1	AC (DXR+CPA)	ドキシソルビシン	60 mg/m ²	1	21	HEC
		シクロホスファミド	600 mg/m ²	1	21	
2	エリブリン+HER	エリブリン	1.4 mg/m ²	1,8	21	LEC
		トラスツズマブ	8→6 mg/kg	1	21	
3	FEC	フルオロウラシル	500 mg/m ²	1	21	HEC
		エピルビシン	100 mg/m ²	1	21	
		シクロホスファミド	500 mg/m ²	1	21	
4	GEM	ゲムシタビン	1250 mg/m ²	1,8	21	LEC
5	Eribulin	エリブリン	1.4 mg/m ²	1,8	21	LEC
6	VNR	ビノレルビン	25 mg/m ²	1,8	21	最小度
7	VNR+HER	ビノレルビン	25 mg/m ²	1,8	21	最小度
		トラスツズマブ	8→6 mg/kg	1	21	
8	T-DM1	トラスツズマブエムタンシン	3.6 mg/kg	1	21	LEC
9	Trasutuzumab	トラスツズマブ	8→6 mg/kg	1	21	最小度
10	Weekly PTX	パクリタキセル	80 mg/m ²	1,8,15	28	LEC
11	テセントリク+アブラキサン	アテゾリズマブ	840 mg	1,15	21	LEC
		パクリタキセルアルブ [®] ミン懸濁型	100 mg/m ²	1,8,15	21	
12	DTX	ドセタキセル	75 mg/m ²	1	21	LEC
13	TC (DTX+CPA)	ドセタキセル	75 mg/m ²	1	21	MEC
		シクロホスファミド	600 mg/m ²	1	21	
14	GT	ゲムシタビン	1250 mg/m ²	1,8	21	LEC
		パクリタキセル	175 mg/m ²	1	21	
15	PTX+Bev	パクリタキセル	80 mg/m ²	1,8,15	28	MEC
		ベバシズマブ	10 mg/kg	1,15	28	

16	CMF (CPA+MTX+5FU)	シクロホスファミド	500 mg/m ²	1,8	28	MEC
		メトトレキサート	40 mg/m ²	1,8	28	
		フルオロウラシル	600 mg/m ²	1,8	28	
17	Trastuzumab + DTX	トラスツズマブ	8→6 mg/kg	1	21	LEC
		ドセタキセル	75 mg/m ²	1	21	
18	Pertuzumab + Trastuzumab + DTX	ペルツズマブ	840→420 mg	1	21	LEC
		トラスツズマブ	8→6 mg/kg	1	21	
		ドセタキセル	75 mg/m ²	1	21	
19	再発キイトルーダ + CBDCA + GEM	ペムブロリズマブ	200 mg	1	21	MEC
		カルボプラチン	AUC=2	1,8	21	
		ゲムシタビン	1000 mg/m ²	1,8	21	
20	術前①キイトルーダ + PTX + CBDCA	ペムブロリズマブ	200 mg	1	21	MEC補強
		パクリタキセル	80 mg/m ²	1,8,15	21	
		カルボプラチン	AUC=5	1	21	
21	術前②キイトルーダ + EC	ペムブロリズマブ	200 mg	1	21	HEC
		エピルビシン	90 mg/m ²	1	21	
		シクロホスファミド	600 mg/m ²	1	21	
22	術後キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200 mg	1	21	最小度
23	HER + PER	トラスツズマブ	8→6 mg/kg	1	21	最小度
		ペルツズマブ	840→420 mg	1	21	