

膵臓・胆道	レジメン名	使用薬剤	投与量	投与日	終了日	催吐リスク
1	GEM + アブラキサン	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	1,8,15	21	MEC (例外)
		パクリタキセルアルブ <sup>®</sup> ミン懸濁型	125 mg/m <sup>2</sup>	1,8,15	21	
2	GEM + CDDP	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	1,8	21	MEC (例外)
		シスプラチン	25 mg/m <sup>2</sup>	1,8	21	
3	GCS (CDDP + GEM + S1)	シスプラチン	25 mg/m <sup>2</sup>	1	21	MEC (例外)
		ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	1	21	
		S-1 (内服)		1~14	21	
4	オニバイド + 5FU + LV	イリノテカン塩酸塩 <sup>®</sup> ソム	70 mg/m <sup>2</sup>	1	14	MEC
		フルオロウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	23 h	14	
		レボホリナートカルシウム	200 mg/m <sup>2</sup>	1	14	
5	FOLFIRINOX	レボホリナートカルシウム	200 mg/m <sup>2</sup>	1	14	HEC (例外)
		イリノテカン	180 mg/m <sup>2</sup>	1	14	
		フルオロウラシル	2400 mg/m <sup>2</sup>	23 h	14	
		フルオロウラシル (ホ <sup>®</sup> -ラス)	400 mg/m <sup>2</sup>	1	14	
		オキサリプラチン	85 mg/m <sup>2</sup>	1	14	
6	GEM	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	1,8,15	28	LEC
7	GS (GEM + S1)	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	1,8	21	MEC (例外)
		S-1 (内服)		1~14	21	